

**Nomograma baseado em peso para infusão intravenosa de heparina.**

**Dose de ataque: 80 unidades / kg em bolus. Continuar com 18 unidades / kg por hora.**

<b>PTTa &lt;35 s</b> <b>(&lt;1,2 x controle)</b>	<b>80 unidades / kg em bolus, aumentar a taxa de infusão mais 4 unidades / kg por hora.</b>
<b>PTTa 35- 45 s</b> <b>(1,2 - 1,5 x controle)</b>	<b>40 unidades / kg em bolus, então aumentar a taxa de infusão mais 2 unidades / kg por hora.</b>
<b>PTTa 46 - 70 s</b> <b>(1,5 - 2,3 x controle)</b>	<b>Sem alteração.</b>
<b>PTTa 71- 90 s</b> <b>(2,3 - 3,0 x controle)</b>	<b>Diminuir a taxa de infusão menos 2 unidades / kg por hora.</b>
<b>PTTa &gt; 90 seg</b> <b>(&gt; 3,0 x controle)</b>	<b>Suspender infusão por 1 hora. Em seguida, diminuir a taxa de infusão em 3 unidades / kg por hora.</b>
<b>PTTa</b>	<b>Tempo de tromboplastina parcial ativada. Deve ser solicitado a cada 6 horas após a dose inicial ou após cada alteração da dose.</b>

Modificado de Raschke, RA, Reilly, BM, Guidry, JR, et al, Ann Intern Med 1993; 119:874.