Hospital Municipal Miguel Couto
Centro de Terapia Intensiva

MONITORAÇÃO OXI-HEMODINÂMICA
CTI – HMMC

Paciente: _____ Prontuário: _____ Leito: _____

Diagnóstico: _____

Data da Inserção: _____ Radiografia de Controle: _____ Peso Ideal: _____ Altura: _____

Parâmetros	Data/Hora												Valores Normais
FC													
PAS													
PAD													
PAM													70 – 105 mmHg
PAPS													15 – 25 mmHg
PAPD													8 – 15 mmHg
PAPM													10 – 20 mmHg
PoAP													6 – 12 mmHg
PADM (PVC)													1 – 6 mmHg
IS													40 – 70 ml/m^2
IC													2,4 – 4,0 l/min·m^2
ITSVE													40 – 60 g·m/m^2
ITSVD													4 – 8 g·m/m^2
IRVS													1600 – 2400 dina·s /m^5·m^2
IRVP													200 – 400 dina·s/ m^5·m^2
CaO_2													16 – 22 ml/dl
CvO_2													13 – 17 ml/dl
$C(a\text{-}v)O_2$													3 – 5 ml/dl
VO_2													180 – 280 ml/min
DO_2													640 – 1200 ml/min
TeO_2													0,2 – 0,3
$P(A\text{-}a)O_2$													
Qs/Qt													< 0,5
Vd/Vt													< 0,4
	a	v	a	v	a	v	a	v	a	v	a	v	
pH													
pO_2													
pCO_2													
HCO_3													
SO_2													
BE													
Dopamina													<4 – >10 μg/kg/min
Dobutamina													2,5 – 20 μg/kg/min
Noradrenalina													0,05 – 5 μg/kg/min
Adrenalina													0,05 – 5 μg/kg/min
Nitroprussiato													0,5 – 10 μg/kg/min
Nitroglicerina													5 – 100 μg/min
Fentanil													25 – 100 μg/h
Propofol													5 –100 μg/kg/min
Midazolam													1 – 10 mg/h